



Ultima masa a rozatoarelor

RODENTICID
AUTORIZAT LA
NIVEL EUROPEAN,
IN TOATE TARILE UE



Racumin[®]
PASTE

- ☑ Rodenticid din grupa anticoagulantelor
- ☑ Formulată sub formă de pasta de culoare albastră, ambalată în pliculețe de 10 g, confecționate dintr-o hartie specială, biodegradabilă
- ☑ Extrem de atractiv pentru rozătoare dar nepericulos pentru utilizator și animale domestice (conține repelentul de gust Bitrex[®])
- ☑ Eficacitate deosebită datorită caracteristicilor de unică deosebită și raritate ale substanței active

RODENTICID



DAUNATORI VIZATI:

Soarecele de casa (*Mus Musculus*)
Sobolanul negru de oras (*Rattus Rattus*)
Sobolanul comun (*Rattus Norvegicus*)

COMPOZITIE:

100 g de Racumin® Paste contin:
Coumatetralyl: 0,0375 g (0,0375%) ~ 375 mg/Kg
Coformulanti: pana la 100 g

FORMULARE:

PA – pasta (momeala raticida)

PROFIL TEHNIC:

CLASIFICARE TOXICOLOGICA:
Xn - Nociv

CLASIFICARE DE MEDIU:
N – periculos pentru mediu

Avizare in Romania:
nr. RO/2013/0057/MRA/FR-2013-0007
produs biocid (Grupa principala: 3, Tip produs: 14)

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:

- ⊙ In zonele infestate cu rozatoare
- ⊙ In fermele de animale (porcine, bovine, ovine, cabaline, pasari, etc.)
- ⊙ In zonele urbane sau periurbane
- ⊙ Depozite de gunoi menajer, ghene de gunoi, statii de tomberoane, etc.
- ⊙ Aplicare numai in statii de intoxicare sau puncte inchise de momeala

Doze de aplicare recomandate si indicatii de utilizare:

Tipul de rozator	Doza de momeala	
Soarecele de casa	20 - 30 g	Statie de intoxicare
Sobolan comun	100 - 120 g	Statie de intoxicare
Soarece/Sobolan	4 - 5 Kg	10 000 m ²

*) numarul de statii de intoxicare, ca si consumul final, depinde de gradul de infestare al suprafetei si apetitul de consum al rozatoarelor



Bayer

S.C. Bayer S.R.L.

Sos. Pipera nr. 42, etaj 1, 16 si 17

020112, sector 2, Bucuresti

Tel: +40 (021) 529 59 00 | Fax: +40 (021) 529 59 92