

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 25.02.1999 – 2010 / 172

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı	Uygulama alanı ve şekli	İstasyon içerisinde uygulanan doz	Uygulama aralığı
Fare – Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 15-30 gram	15 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sıçan – Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m ² 'de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m ² 'de bir uygulanır.	İstasyon başına 50-100 gram	10 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

1 mum blok yemin ağırlığı: 15, 25 gr

Kullanma şekli:

- Ambalajın açılmasından başlayarak mücadelenin tüm aşamalarında mutlaka ELDİVEN kullanınız. Bu hem sizi koruyacak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminden kaçınmasını engelleyecektir.
- Yem istasyonlarının uygulanması sırasında hedef dışı canlıların temasını engelleyecek ve fare ve sıçanların tüketiminin daha kolay olmasını sağlayacak alanları seçiniz.
- UYGULAMA MUTLAKA YEM İSTASYONU İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR. Yem istasyonları çocuklar ve hedef dışı canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı ve içerisinde yemin dış etmenlerden koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.
- Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi alanlar, kemirilmiş alanlar, Remirgen dışıklarının görüldüğü yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuru bölgelerdir.
- Zararlı tespit edilen uygun alanlara YEM İSTASYONLARI yerleştirilmeli ve içerisinde uygulama tablosuna uygun miktarda ürün bırakılmamalıdır.
- 2-3 gün aralıklarla yem istasyonlarını/uygulama yapılan yerleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerine yenilerini ekleyiniz.
- Tüketilmeyen yemlerin bulunduğu istasyonları yerlerini ve bulaşık ve bozulmuş yemleri yenisi ile değiştirin.
- Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulamaya devam ediniz.

Üretici firmanın adı ve adresi:Lipha Tech S.A.S. Production centre, Av Jean Serres,
ZA Malèze, 47480 Pont du Cassé, FRANSA**Dolum yeri adı ve adresi:**Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti
Barış Mah. Anibal Cad. No: 1 41410 Gebze / KOCAELİ**Ruhsat sahibinin adı ve adresi:**

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 34770

Ümraniye İSTANBUL

İthalat miktarı: 7,5 kg

Dolum miktarı: 90 gr (6 x 15 gr) - 120 gr (8 x 15 gr) - 150 gr (10 x 15 gr) - 180 gr (12x15gr) - 225 gr (15x15gr) - 250 gr (10x25 gr) - 300 gr (20 x 15gr) - 330 gr (22 x 15gr) - 450 gr (30 x 15gr) - 1000 g (40 x 25 gr) - 1050 g (70 x 15 gr) - 1500 g (100 x 15gr) - 3000 g (100 x 15gr) - 5000 g (200 x 25 gr) - 7500 g (500 x 15 gr) - 10000 g (400 x 25 gr)

Net miktarı: 90 gr (6 x 15 gr) - 120 gr (8 x 15 gr) - 150 gr (10 x 15 gr) - 180 gr (12x15gr) - 225 gr (15x15gr) - 250 gr (10x25 gr) - 300 gr (20 x 15gr) - 330 gr (22 x 15gr) - 450 gr (30 x 15gr) - 1000 g (40 x 25 gr) - 1050 g (70 x 15 gr) - 1500 g (100 x 15gr) - 3000 g (100 x 15gr) - 5000 g (200 x 25 gr) - 7500 g (500 x 15 gr) - 10000 g (400 x 25 gr)

KULLANICI GRUBU
UZMAN PERSONEL**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ**
MUTLAKA OKUYUNUZ**Rodilon® Mum Blok**

Fare ve Sıçan Mücadelesi İçin Rodentisit

Formülasyon şekli
Mum Blok

Aktif maddenin adı ve miktarı (% a/a)
Difethialone, CAS No: 104653-34-1 % 0,0025

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)
%99,9975 diğer yardımcı maddeler ve Bitrex ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**
HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.Ambalajı açılmış ürünü 1 ay içinde kullanınız,
Ürünün raf ömrü 25±2 °C'de 2 yıldır.**Boş ambalaj imha şekli:**

Boş ambalajları dere, göl, ırmak gibi doğal su kaynaklarının bulunduğu yerlere atmayınız. usulüne uygun olarak imha ediniz.

Esra GÜVENÇ

Mesul Müdür

SGÇ&Sürdürülebilirlik Müdürü

ÜRÜN TİPİ (14)
RODENTİSİT**Zehirlenme belirtileri:**

Rodilon mum blok kullanımında dikkatsizlik ve ihmal sonucu ağızdan alındığı takdirde; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri ve iç kanamalara, bazen de ağız ve burundan kan gelmesi şeklinde zehirlenmelere neden olur.

LD₅₀ değeri:LD₅₀ Difethialone (Akut Oral) (sıçan): 0.56 mg/kgLD₅₀ Rodilon Mum Blok (Akut Oral)(sıçan)>5000 mg/kg**İlk yardım önlemleri:**

Zehirlenen kişi ürün etiketiyle birlikte derhal doktora götürülmelidir.

Antidodu ve gerekli bilgiler:

Vit K1 tatbik edilir.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT**
EDİLECEK HUSUSLAR

Rodilon Mum Blok kanın pıhtılaşmasını önleyerek iç kanamaya neden olabilir. Artık ilaçları göllere, durgun ve akarsulara, havuzlara bulaştırmayınız. Uygulamadan sonra el, yüz ve ilaçla bulaşık vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Ürünü 25±2 °C'de muhafaza ediniz.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

TEHLİKE AÇIKLAMALARI

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM AÇIKLAMALARI

P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınınız.

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Uyarı Kelimesi: Dikkat

İlker LODOS

Mesul Müdür

Kalite Kontrol Müdürü